

Состав

действующие вещества: камфора естественная, скипидар, масло эвкалиптовое, ментол рацемический, масло сосновой хвои;

1 г мази содержит 0,06 г камфоры естественной, 0,06 г скипидара, 0,04 г масла эвкалиптового, 0,02 г ментола рацемического, 0,014 г масла сосновой хвои;

вспомогательные вещества: воск неионный эмульгированный, масло минеральное, полиэтиленгликоля (макрогол) цетостеариловый эфир и спирт стеариловый, ароматизатор сосновой хвои, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), калия дигидрофосфат, натрия фосфат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: гомогенная мягкая мазь белого цвета с запахом эфирных масел.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТХ М02А Х10.

Фармакодинамика

«Баинвель мазь интенсив» - комбинированное лекарственное средство для местного применения. Терапевтическое действие мази обусловлено фармакологическими свойствами активных компонентов, входящих в ее состав. Мазь оказывает отвлекающее, противовоспалительное, местное раздражающее и умеренное антисептическое действие.

При втирании в кожу раздражает чувствительные нервные окончания кожи и подкожных тканей, расширяет поверхностные сосуды, вызывает ощущение жара, улучшает кровоснабжение кожи и подкожных тканей.

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики камфары, скипидара, эвкалиптового масла и масла сосновой хвои показывают, что эти вещества всасываются как через кожу,

так и через дыхательные пути (ингаляционно), а выводятся через легкие или с мочой и калом.

Показания

Для симптоматического лечения ревматического артрита, люмбаго, ишиаса, боли в спине, миалгии, артралгии, невралгии; миозита, при ушибах и растяжениях; для лечебного и спортивного массажа.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным веществам, 1,8-цинеол или любых вспомогательных веществ. Нарушение целостности кожи, повреждения кожи, например, вследствие ожогов, экзема, дерматит. Бронхиальная астма, коклюш, псевдокруп и другие болезни дыхательных путей, связанные с повышенной чувствительностью дыхательных путей, - поскольку вдыхание препарата может вызвать спазмы бронхиальных мышц. Склонность к судорогам, эпилептические припадки в анамнезе. Противопоказано применять: детям до 4 лет, поскольку препараты, содержащие 1,8-цинеол, как и другие эфирные масла, могут вызвать ларингоспазм; детям, в анамнезе которых судороги (фебрильные или другие).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Эвкалиптовое масло усиливает активность энзимов печени, может ослаблять действие других препаратов или сокращать продолжительность их действия. Это не исключено в случае длительного применения препарата.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Не допускать попадания препарата «Баинвель мазь интенсив» непосредственно на слизистые оболочки глаз, рта или носа. В случае попадания мази на слизистые оболочки или в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды.

После применения препарата следует тщательно вымыть руки, чтобы предотвратить контакт с лицом, прежде всего с глазами. Необходимо обратить внимание на то, чтобы дети не касались участков кожи, на которые были нанесены препарат. При случайном попадании лекарственного средства в нос или на лица детей может возникнуть апноэ из-за спазма голосовой щели

(ларингоспазм) - это состояние, требующее неотложной медицинской помощи.

Метилпарабен и пропилпарагидроксибензоат могут вызывать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Полиэтиленгликоля (макрогол) цетостеариловый эфир и спирт стеариловый может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

При появлении покраснения или отеков на участках, на которые наносилась мазь, следует обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Никакого влияния на способность управлять автотранспортом или другими механизмами не наблюдалось. В случае возникновения побочных реакций со стороны нервной системы (головокружение, возбуждение) следует быть осторожным.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность применения лекарственного средства во время беременности и кормления грудью не установлена.

Из-за отсутствия достаточных данных не следует применять мазь в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

«Баинвель мазь интенсив» наносить легкими движениями 2-3 раза в день на болезненные участки тела.

На участок тела величиной с ладонь достаточно полоски мази длиной около 0,5-1 см. Мазь необходимо втирать до полного впитывания в кожу.

Препарат применяют до исчезновения симптомов заболевания. Если после 5 дней лечения состояние не улучшилось, нужно обязательно обратиться к врачу.

Дети

Не применять детям до 4 лет. Не следует наносить на участки лица и шеи детям до 6 лет.

Передозировка

Передозировка может вызвать раздражение кожи.

Препарат обычно не оказывает системного токсического действия при превышении рекомендуемой дозы, однако чрезмерное наружное применение на больших участках может вызвать токсические симптомы, такие как нефротоксичность, нарушения со стороны центральной нервной системы (непосредственно после применения камфоры).

Неправильное использование.

Случайное проглатывание мази может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, такие как рвота и диарея. Лечение симптоматическое.

В случае возникновения симптомов острого отравления (после случайного приема значительного количества препарата), таких как тошнота, рвота, боль в животе и головные боли, головокружение, чувство жара / прилива, возбуждение, галлюцинации, судороги, угнетение дыхания и кома, показан уход за пациентом в стационаре. В случае проявлений угнетения дыхания необходима интубация может потребоваться вспомогательное искусственное дыхание и мероприятия интенсивной терапии. Пациенты с серьезными желудочно-кишечными или неврологическими симптомами отравления следует наблюдать и лечить симптоматически. Не следует вызывать рвоту.

Побочные реакции

Аллергические реакции, включая покраснение кожи, сыпь, зуд, крапивница, контактный дерматит головная боль, головокружение, возбуждение, возможно возникновение судорог, вызванное камфарой. В редких случаях могут возникать симптомы раздражения слизистых оболочек, бронхоспазм.

Раздражение кожи или аллергические реакции обычно не выражены и возникают очень редко. Вдыхание во время втирания может вызвать такие рефлекторно обусловленные симптомы, как свистящее дыхание, кашель, одышка и затруднение дыхания вследствие сужения дыхательных путей. Это может привести к астматического состояния и остановки дыхания.

При длительном применении на большие участки тела возможно поражение почек.

Возможны ожоги на месте применения мази. Частота неизвестна.

В случае возникновения побочных реакций необходимо немедленно прекратить применение лекарственного средства, удалить остатки препарата салфеткой и обратиться за консультацией к врачу.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

Упаковка

По 50 мл в тубе; по 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/ Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Михелинштрассе 10 66424 Хомбург, Германия / Michelinstrasse 10 66424 Homburg, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).