

Состав

действующее вещество: хондроитина сульфат, 1 г геля содержит хондроитина сульфата 50 мг (0,05 г);

вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, пропиленгликоль, спирт изопропиловый, этанол, натрия метабисульфит (Е 223), метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), карбомер, апельсиновый аромат (содержит бергамотовое масло и другие), вода очищенная.

Лекарственная форма

Гель.

Желтоватый полупрозрачный однородный гель с фруктовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Нестероидные противовоспалительные средства. Хондроитина сульфат. Код АТХ М01А Х25.

Фармакологические свойства

Хондроксид® содержит натуральный компонент хондроитина сульфат, который получают из хрящевой ткани трахеи крупного рогатого скота. Хондроитина сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридами, который тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Подавляет ферменты, которые способствуют распаду хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает выработку внутрисуставной жидкости, стимулирует синтетические процессы в хондроцитах, улучшая их структуру. Способствует восстановлению матрикса хрящевой ткани.

Диметилсульфоксид, который входит в состав геля, способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата вглубь тканей. Препарат хорошо всасывается с поверхности кожи, максимальная концентрация хондроитина сульфата в плазме крови достигается через 3-4 часа после применения. Биодоступность составляет 25%.

Выводится в основном почками в течение 24 часов. Хондроксид® уменьшает боль в пораженных суставах и способствует увеличению их подвижности, а

также замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза.

Показания

Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (преимущественно локализованные формы): остеоартроз периферических суставов и остеохондроз позвоночника.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату, тромбофлебит, склонность к кровоточивости, острые воспалительные процессы в месте нанесения препарата.

Особенности применения

Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая попадания препарата на открытые раны, в глаза, на слизистые оболочки. Лекарственное средство содержит бергамотовое масло, которое может повышать чувствительность к ультрафиолетовому облучению (естественного и искусственного).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и эффективность применения не установлена, поэтому применять препарат можно только в случае, когда, по мнению врача, польза от применения превышает риск.

Способ применения и дозы

Препарат назначений для зовнішнього застосування. Хондроксид® наносити 2-3 рази на день тонким шаром над осередком запалення і легко втирати поплескуючими рухами протягом 2-3 хвилин до повного його вбирання шкірою. Курс лікування визначається індивідуально залежно від ефективності і переносимості та становить від 2-3 тижнів до 2-3 місяців. При необхідності курс лікування повторити. Препарат не лишає на шкірі слідів, не забруднює одяг.

Дети

Не применять.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, включая зуд, гиперемия, жжение, высыпания на коже. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

Упаковка

По 100 мл в алюминиевой тубе в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Компания Волмарк, Олдржиховице 44, 739 61 Тршинец, Чехия.