

Состав

действующие вещества: 100 мл раствора содержит бензокаину 1 г прокаина гидрохлорида 1 г, ментола рацемического 2,5 г.

вспомогательные вещества: этанол 70%.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость с запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТХ M02A X.

Фармакологические свойства

Препарат обладает противозудным действием и местноанестезирующее эффект. При нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение нервных окончаний, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и покалывания.

Оказывает легкое обезболивающее действие.

Фармакокинетика

При местном применении препарат не поступает в кровяное русло.

Показания

Препарат назначают при невралгиях, миалгиях, артралгиях.

Противопоказания

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к новокаина и других составляющих компонентов препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Компоненты препарата (новокаин, анестезин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов. Усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения

Не наносить на поврежденную кожу и кожу с проявлениями аллергии. Не наносить на кожу лица.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно. Болезненные участки кожи растирают Меновазином 2-3 раза в сутки. Курс лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффекта препарата, а также от характера лечения (монотерапия или в комплексе с другими лекарственными средствами).

Дети

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

При длительном применении возможны головокружение, общая слабость, снижение артериального давления, аллергические реакции. При появлении таких симптомов препарат следует отменить, остатки смыть с поверхности кожи водой, провести симптоматическую терапию.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (гиперемия, раздражение кожи, зуд, сыпь, отек, крапивница).

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

2 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконе в пачке или без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО "Микрофарм", Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Производитель

ООО «Микрофарм».

Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

Заявитель

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).