

Состав

действующие вещества: ментол, настойка листьев эвкалипта (*Eucalypti folium*), глицерин

1 мл раствора содержит ментола 0,0071 г, настойки листьев эвкалипта (*Eucalypti folium*) (1: 5) (экстрагент - этанол 70%) 0,357 мл, глицерина (85%) 0,357 г

вспомогательные вещества: этанол 96%.

Лекарственная форма

Раствор.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желто-бурого цвета, с запахом ментола и эвкалипта.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05C A10.

Фармакодинамика

Препарат относится к средствам, которые оказывают комплексную отхаркивающее, антисептическое и противовоспалительное действие. Ментол обладает способностью раздражать рецепторы слизистой оболочки и усиливать местное кровообращение. Настойка листьев эвкалипта оказывает муколитическое, отхаркивающее, противомикробное и противовоспалительное действие. Глицерин разжижает воспалительные экссудаты. Спирт этиловый является антисептическим и дезодорирующим веществом, усиливает эффекты других компонентов.

Показания

Местное лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний различной этиологии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, бронхиальная астма, бронхоспазм.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие неизвестна. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения

В связи с возможностью развития рефлексного бронхоспазма детям необходимо применять препарат под наблюдением врача или взрослых.

При возникновении одышки, лихорадки или гнойной мокроты следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат может влиять на скорость реакции, поэтому при его применении следует воздерживаться от управления автотранспортом или потенциально опасных видов деятельности.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только после оценки врачом соотношения риск / польза.

Способ применения и дозы

2,5 мл (0,5 чайной ложки) препарата растворить в стакане теплой воды и использовать в виде ингаляций. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально в зависимости от достигнутого эффекта, характера комплексной терапии и переносимости препарата.

Дети

Не применять детям до 3 лет.

Передозировка

При длительном применении в больших дозах возможны головокружение, спутанность сознания, мышечная слабость, тошнота, двоение в глазах, раздражение в области губ и носа. В таких случаях прекращают прием препарата. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе высыпания на коже, зуд, покраснение, контактный дерматит (в области губ), отек Квинке, крапивница бронхоспазм, ларингоспазм, апноэ.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу!

Срок годности

3 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г.. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).