

Состав

действующие вещества: ментол кристаллический, камфора рацемическая, масло эвкалиптовое, масло гвоздичное;

1 г мази содержит ментола кристаллического 0,18 г, камфоры рацемической 0,10 г, масла эвкалиптового 0,10 г, масла гвоздичного 0,01 г;

вспомогательные вещества: парафин, парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Физико-химические свойства: мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТС М02А Х10.

Фармакодинамика

Механизм действия препарата обусловлен действующими веществами, входящими в состав препарата. Раздражает нервные окончания, расширяет артериолы и капилляры, способствует развитию отвлекающего и обезболивающего действия. Уменьшает экссудацию и уплотняет клеточные мембраны. Проявляет отвлекающее, слабое анальгезирующее, умеренное противовоспалительное, антисептическое действие.

Фармакокинетика

Не определялась.

Показания

Боль в суставах и мышцах, невралгия, миозит, артрит, миалгия, артралгия, ревматизм, ишиас.

Противопоказания

Заболевания кожи, раны в местах предполагаемого нанесения препарата, дерматит, коклюш, экзема, склонность к бронхоспазма или судом. Гиперчувствительность к любым компонентам препарата. Возраст до 3 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

Не наносить на слизистые оболочки! Не допускать попадания препарата в глаза. В случае случайного попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

При втирании в кожу вызывает ощущение холода, потом теплоты, слабого жжения и покалывания.

Не следует наносить мазь на поврежденную кожу.

После каждого применения мази тщательно мыть руки.

При сильном раздражении кожи втирания следует прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

С осторожностью по назначению врача применять в период беременности и кормления грудью с учетом соотношения риск / польза.

Способ применения и дозы

Применять наружно для растираний. Мазь втирать в кожу над пораженным суставом или мышцей по 2-3 г 2-3 раза в сутки. Курс лечения зависит от тяжести течения заболевания, а также от характера сопутствующей терапии и

определяется врачом индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

Ощущение сильного тепла и жжение в месте нанесения мази. Возможны проявления гиперчувствительности, которые требуют отмены препарата. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Возможно развитие аллергических реакций - покраснение кожи, сыпь, крапивница, контактный дерматит, зуд, головная боль, головокружение, возможно возникновение судорог, вызванное камфарой. У детей может возникнуть дерматит.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 г в тубе в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).