

Состав

действующие вещества: 2,0 мл раствора содержат: Acidum silicicum D8 - 83 мг, Berberis vulgaris D4 - 143 мг, Bryonia D4 - 143 мг, Calcium hypophosphorosum D3 - 83 мг, Cinchona pubescens D4 - 83 мг, Coffeinum monohydricum D4 - 83 мг, Colchicum autumnale D4 - 143 мг, Convallaria majalis D4 - 83 мг, Echinacea D4 - 83 мг, Ferrum phosphoricum D10 - 83 мг, Formica rufa D10 - 83 мг, Formica rufa D4 - 83 мг, Formica rufa D6 - 83 мг, Lithium chloratum D3 - 83 мг, Rhus toxicodendron D4 - 146 мг, Salix alba D4 - 143 мг, Smilax D4 - 143 мг, Solidago virgaurea D3 - 83 мг

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат метаболического, противовоспалительного, обезболивающего, противоревматического, диуретического, антисептического действия. Действие лекарственного средства основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в его состав.

Показания

В составе комплексного лечения мочекишечного диатеза, подагры, мочекаменной диатеза, нарушений пуринового обмена, артритов.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Ревматизм, новообразования.
- Период беременности и кормления грудью.

- Возраст до 12 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

О случаях взаимодействия не сообщалось, и они не предусматриваются благодаря гомеопатическим разведением, содержащиеся в препарате.

Вследствие иммуностимулирующего действия эхинацея может уменьшать эффективность препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие. Необходимо сообщить врачу обо всех препаратах, которые применялись в последнее время, даже если они отпускаются без рецепта.

Особенности применения

Если симптомы не исчезают или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

Не рекомендуется применять больным с туберкулезом, саркоидозом, заболеваниями системы крови (лейкозы, лейкемии), аутоиммунными заболеваниями, иммунодефицитом.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, то есть практически свободный от натрия.

В начале лечения лекарственным средством возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 1 ампула по 2,0 мл. Применять разовую дозу в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных инъекций - 1-3

раза в неделю.

Курс лечения - 4-6 недель.

Инструкция для открытия стеклянного флакона (ампулы)

Открывать осторожно. Следуйте этой инструкции.

Разрезать стеклянную ампулу не обязательно. Держите ампулу верхней частью вверх под наклоном; жидкость, которая находится в верхней части ампулы, встряхните вниз. Отломите верхнюю часть ампулы, где находится цветная отметка.

Неиспользованный остаток раствора вылить.

Дети

Лекарственное средство рекомендуется для детей от 12 лет.

Передозировка

Возможно усиление побочных реакций; при применении высоких доз препарата возможно возникновение тошноты, рвоты, диареи, бессонницы, повышенного возбуждения.

Побочные реакции

В редких случаях могут возникать временные аллергические реакции, изменения в месте введения, тошнота, рвота, диарея, боль в животе. При применении препаратов, содержащих эхинацею, наблюдались высыпания на коже, зуд, крапивница, возбуждение, нарушение сна.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Несовместимость. Неизвестна. Препарат не следует смешивать с другими препаратами в одной емкости, кроме препаратов производителя «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ» (Biologische Heilmittel Heel GmbH).

Упаковка

5 ампул по 2,0 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).