

Состав

действующее вещество: thiocolchicoside;

1 г крема содержит тиоколхикозиду 2,5 мг

вспомогательные вещества: полисорбат 80, ланолин кондитерский, спирт цетиловый, воска цетил эфиры, стеариновая кислота, метилпарабен (Е 218), этилпарабен (Е 214), натрия альгинат, натрия лаурилсульфат, эссенция липы, вода очищенная.

Лекарственная форма

Крем.

Основные физико-химические свойства: светло-желтый однородный крем.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной болях. Код АТХ М02А Х10.

Фармакодинамика

Тиоколхикозид является полусинтетическим миорелаксантом, получаемый из натурального гликозида колхикозида.

Тиоколхикозид связывается только с ГАМК и стрихнин-чувствительными глициновыми рецепторами. Тиоколхикозид действует как антагонист ГАМК-рецепторов. Его миорелаксирующее действие обусловлено комплексом механизмов на супраспинальном уровне. Не оказывает курареподобного действия.

Фармакокинетика

После местного применения тиоколхикозида в рекомендуемых дозах для лечения болезненных контрактур мышц, его плазменные уровни были ниже минимального уровня определения. Это свидетельствует об отсутствии системной абсорбции.

Показания

Симптоматическое лечение болезненных контрактур мышц:

- острый период пояснично-крестцового радикулита;
- шейно-плечевая невралгия;

- спастическая кривошея;
- посттравматическая боль;
- послеоперационная боль.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
- Вялый паралич;
- гипотония мышц;
- беременность;
- кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данных о каких-либо клинически значимых взаимодействиях с другими лекарственными средствами нет.

Особенности применения

Длительное применение тиоколхикозида может вызвать развитие реакций сенсibilизации. В этом случае следует прекратить прием препарата и начать соответствующее лечение.

Препарат содержит метилпарабен (Е 218) и этилпарабен (Е 214) которые могут вызывать реакции гиперчувствительности замедленного (контактный дерматит) и немедленного (крапивница и бронхоспазм) типа.

Препарат содержит спирт цетиловый и ланолин кондитерский, которые могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Нет данных о влиянии тиоколхикозида на способность управлять автотранспортом или другими механизмами. В очень редких случаях возможно развитие сонливости, что следует учитывать при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данных по местному применению тиоколхикозида беременным нет. Препарат противопоказан в период беременности.

В случае необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для наружного применения взрослым.

Крем нанести на пораженный участок тела 2-3 раза в сутки и слегка втереть в кожу. В случае развития побочных реакций следует уменьшить дозу препарата (согласно рекомендации врача). Продолжительность применения препарата зависит от показаний и эффективности лечения.

Дети

Данных по местному применению тиоколхикозида детям нет. Препарат не следует применять детям.

Передозировка

Данных о случаях передозировки нет. Возможно усиление побочных реакций.

Побочные реакции

В редких случаях возможно развитие реакций гиперчувствительности (контактный дерматит, крапивница, бронхоспазм, ангионевротический отек). В случае развития побочных реакций следует уменьшить дозу препарата (согласно рекомендации врача).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ Тиджей. А.Ш., Турция/WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC. A.S., Turkey.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

15 Теммуз Махаллеши Джами Йолу Джаддеси №50 Гюнешли Бешикташ/Стамбул, Турция/15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No: 50 Gunesli Bagcilar/Istanbul, Turkey.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).