

Состав

действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща обыкновенного;

1 капсула содержит 52,5 мг плюща обычных листьев экстракта сухого (*Hederae heliсis e folium*) ((4–8):1) (экстрагент этанол 30%);

другие составляющие: целлюлоза микрокристаллическая, мальтодекстрин, крахмал кукурузный, коповедон, магния стеарат;

состав оболочки капсулы: желатин, диоксид титана (Е 171), железа оксид желтый (Е 172), индиготин (Е 132).

Лекарственная форма

Капсулы.

Основные физико-химические свойства: жесткие желатиновые капсулы № 3, корпус капсулы и крышечка – темно-зеленого цвета. Содержимое капсулы – порошок светло-коричневого цвета, содержащий небольшие дольки от светлого до более темного цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Лекарственное средство растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт листьев плюща, который оказывает противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое, противовоспалительное, антимикробное действие, обусловленное наличием гликозидов (сапонинов).

Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем; симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к активному веществу, растениям семейства Аралиевых или к любому другому компоненту препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении Пектолван плющ и других лекарственных средств побочного действия препарата не наблюдалось. Поэтому препарат можно применять вместе с другими лекарственными средствами, например антибиотиками.

Особенности применения

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.

Одновременное применение противокашлевых лекарственных средств, содержащих кодеин или дексметорфан, не рекомендуется без консультации врача.

Осторожно применять препарат пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя) менее 100 мг/дозу.

Суточная доза капсул Пектолван Плющ (3 капсулы) содержит 0,00675 ХО, что нужно учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям от 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально. В легких случаях продолжительность лечения составляет 1 нед. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуется продолжать терапию в течение 2–3 суток после улучшения состояния пациента.

Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу для дальнейшего лечения.

Дети

Препарат можно применять детям от 12 лет.

Передозировка

Прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать тошноту, рвоту, диарею или агитацию. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Могут наблюдаться аллергические реакции: одышка, отек слизистых, высыпания на коже, крапивница, зуд.

У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться желудочно-кишечные нарушения, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.

Срок годности

2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 капсул в блистере. По 3 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Фармак».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).