

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: *Achillea millefolium* D0 - 0,09 г *Aconitum napellus* D1 - 0,05 г *Arnica montana* D3 - 1,5 г; *Atropa bella-donna* D1 - 0,05 г *Bellis perennis* D0 - 0,1 г; *Calendula officinalis* D0 - 0,45 г *Echinacea* D0 - 0,15 г *Echinacea purpurea* D0 - 0,15 г *Hamamelis virginiana* D0 - 0,45 г *Hepar sulfuris* D6 - 0,025 г *Hypericum perforatum* D6 - 0,09 г *Matricaria recutita* D0 - 0,15 г *Mercurius solubilis Hahnemanni* D6 - 0,04 г *Symphytum officinale* D4 - 0,1 г;

вспомогательные вещества: карбомер, этанол 96%, натрия гидроксид, вода очищенная.

Лекарственная форма

Гель.

Основные физико-химические свойства: прозрачная желатиновая масса от коричневатого до коричневато-желто-зеленого цвета с запахом этанола и сладковатым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, иммунокорригирующее, репаративное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

Для временного облегчения боли в суставах; при симптомах, связанных с травмами (спортивные травмы, растяжения связок, синяки) для лечения воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата и кожи (например «теннисный» локоть).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному или более активных компонентов или вспомогательных веществ, к арнике, ромашке, тысячелистнику обыкновенному или к другим растениям семейства астровых (сложноцветных).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Случаи взаимодействия неизвестны. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

Особенности применения

Не наносить гель на участки большой площади.

При содержании симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Случаи воздействия неизвестны.

Применение в период беременности или кормления грудью

Токсичность в период беременности и кормления грудью гомеопатически разведенных веществ, входящих в состав данного лекарственного средства, не установлена.

Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью только после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Дорослим та дітям від народження гель наносити тонким шаром на уражені ділянки 1-2 рази на добу або, у разі необхідності, частіше. Зазвичай 1 см Траумель С Гелю покриває приблизно поверхню 10 см x 10 см (10 см²).

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від ефективності терапії. Середній період лікування становить 10 днів.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям от рождения по назначению врача.

Передозировка

Случаев передозировки не отмечалось.

Побочные реакции

Изредка могут наблюдаться реакции гиперчувствительности или местные аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, воспаление кожи, покраснение, опухание или зуд), в случае которых применение препарата необходимо прекратить.

Срок годности

3 года.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

Туба на 50 г в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).