

Состав

действующие вещества: 2,2 мл раствора содержит: Acidum cis-aconicum D10 – 22 мг, Apisinum D8 – 22 мг, Aquilegia vulgaris D4 – 22 мг, Calvatia gigantea D6 – 22 мг, Cypripedium parviflorum var. pubescens D6 – 22 мг, Hydrastis canadensis D4 – 22 мг, Hypophysis suis D13 – 22 мг, Kreosotum D8 – 22 мг, Lachesis D10 – 22 мг, Lilium lancifolium D4 – 22 мг, Magnesium phosphoricum D10 – 22 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni D10 – 22 мг, Ovarium suis D8 – 22 мг, Placenta totalis suis D10 – 22 мг, Psychotria ipecacuanha D6 – 22 мг, Pulsatilla pratensis D18 – 22 мг, Sepia officinalis D10 – 22 мг, Tuba uterina suis D10 – 22 мг, Uterus suis D10 – 22 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство регулирует уровень женских половых гормонов, оказывает метаболическое, седативное и противовоспалительное действие. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в его состав.

Показания

Дисменорея, эндометрит, метрит, параметрит, климакс, недостаточность функции передней доли гипофиза (гипопитуитаризм), крауроз вульвы, мастопатия, остеомалация, меноррагия, различные нарушения метаболизма, связанные со снижением синтеза женских половых гормонов, включая

гериатрические.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

В редких случаях возможно гомеопатическое первоначальное обострение заболеваний, быстро проходит и не требует отмены препарата.

При содержании симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, решается индивидуально с учетом соотношения пользы для матери и риска для плода (ребенка).

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и девушкам пубертатного возраста - 1 ампула по 2,2 мл. Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных, а в случае необходимости - внутривенных инъекций 1-2 раза в неделю.

В зависимости от особенностей течения заболевания и состояния больного врач может изменять продолжительность курса лечения и способ применения.

Курс лечения - 4-6 недель.

Дети

Лекарственное средство рекомендовано для применения девушкам пубертатного возраста.

Передозировка

Не отмечалась.

Побочные реакции

Аллергические реакции. Возможно усиление слюноотделения - в таком случае рекомендуется уменьшить дозу препарата или прекратить.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ / Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/ Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).