

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Achillea millefolium D3 - 15 мг, Aconitum napellus D3 - 30 мг, Arnica montana D2 - 15 мг, Atropa bella-donna D4 - 75 мг, Bellis perennis D2 - 6 мг, Calendula officinalis D2 - 15 мг, Echinacea D2 - 6 мг, Echinacea purpurea D2 - 6 мг, Hamamelis virginiana D2 - 15 мг, Hepar sulfuris D8 - 30 мг, Hypericum perforatum D2 - 3 мг, Matricaria recutita D3 - 24 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 - 30 мг, Symphytum officinale D8 - 24 мг;

вспомогательные вещества: магния стеарат лактоза моногидрат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые, плоские, с фаской, от белого до желто-белого цвета, возможны единичные оранжевые вкрапления, без запаха или с едва сладковатым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, иммунокорректирующее, репаративное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

В комплексной терапии при таких заболеваниях и состояниях: повреждение тканей при травмах (спортивных, бытовых) в виде ушибов, растяжений, вывихов, гематом, переломов костей и суставов; сотрясение головного мозга. Острые и хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, плечелопаточный периартрит, бурсит, артрит тазобедренного, коленного суставов и суставов стоп и кистей рук), зубочелюстного аппарата (периодонтит, пародонтит, гингивит) остеохондроз.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из активных компонентов или вспомогательных веществ, к арнике, ромашке, тысячелистнику или к другим растениям семейства астровых (сложноцветных).

Туберкулез, лейкоз, воспалительные заболевания соединительных тканей (коллагеновые болезни), аутоиммунные заболевания, рассеянный склероз, заболевания системы крови, СПИД, ВИЧ-инфекции, иммуносупрессия или иммунодефицит различной этиологии и другие хронические вирусные заболевания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Совместим с другими лекарственными средствами.

Особенности применения

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

Если симптомы не исчезают или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Токсичность гомеопатически разведенных веществ, входящих в состав лекарственного средства при применении в период беременности и кормления грудью не установлена.

Ни о каких нежелательных реакциях не сообщалось.

Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, решает врач индивидуально с учетом польза/риск.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 1 таблетка под язык (до полного рассасывания) детям до 12 лет - 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 20 мл (4 чайные ложки) кипяченой воды комнатной температуры; принимать разовую возрастную дозу: детям в возрасте до 1 года - 1 чайная ложка, детям в возрасте от 1 до 6 лет - 2 чайных ложки, детям в возрасте от 6 до 12 лет - 3 чайных ложки (остатки раствора хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре не более суток). Разовую возрастную дозу принимать 3 раза в день за 15-20 минут до еды или через 1:00 после еды. В случае острого начала заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2:00. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

Курс лечения - 2-4 недели.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям от рождения.

Передозировка

Не отмечалось. Возможно усиление побочных реакций.

Побочные реакции

Препарат обычно хорошо переносится, но в очень редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью к растениям семейства сложноцветных (например, *Arnica*, *Calendula*, *Achillea millefolium*) или другим компонентам препарата могут возникать гиперсаливация, аллергические реакции, в том числе покраснение, отеки, сыпь, зуд, крапивница - в таком случае применение препарата необходимо прекратить.

После применения препаратов, содержащих экстракты *Echinacea*, наблюдались реакции со стороны пищеварительного тракта (в т. ч. тошнота, боль в животе); менструальные расстройства; акне, крапивница возбуждение, нарушение сна; высыпания на коже, зуд, редко - отек лица, затрудненное дыхание (одышка), головокружение и снижение артериального давления.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

Полипропиленовый контейнер на 50 таблеток в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).