

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: Bryonia D30 - 0,2 г, Bryonia D200 - 0,2 г, Bryonia D1000 - 0,2 г, Bryonia D2 - 0,2 г, Bryonia D6 - 0,2 г, Bryonia D10 - 0,2 г, Bryonia D15 - 0,2 г, Citrullus colocynthis D3 - 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 - 0,3 г, Citrullus colocynthis D30 - 0,3 г, Citrullus colocynthis D200 - 0,3 г, Lycopodium clavatum D10 - 0,3 г, Lycopodium clavatum D30 - 0,3 г, Lycopodium clavatum D200 - 0,3 г, Lycopodium clavatum D1000 - 0,3 г, Lycopodium clavatum D3 - 0,3 г, Strychnos nux-vomica D30 - 0,2 г, Strychnos nux-vomica D15 - 0,2 г, Strychnos nux-vomica D10 - 0,2 г, Strychnos nux-vomica D200 - 0,2 г, Strychnos nux-vomica D1000 - 0,2 г, Strychnos nux-vomica D2 - 0,2 г;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 35% об. этанола 96%.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость с запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат оказывает противовоспалительное, дезинтоксикационное, спазмолитическое и желчегонное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в состав препарата.

Показания

Функциональные нарушения и воспаления со стороны желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и печени, спастический запор, язвенный колит, дивертикулит, гастрит и дуоденит (острый и хронический), язва желудка,

дисбиоз кишечника, метеоризм.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

В начале лечения лекарственным средством возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

В редких случаях гомеопатическое первоначальное обострение может привести к временному головокружению и головной боли, быстро проходит и не требует отмены препарата.

Это лекарственное средство содержит 35 об. % Этаноло (алкоголя), то есть 138 мг / доза, что эквивалентно 4 мл пива, 2 мл вина в дозе.

Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям и пациентам с заболеваниями печени и большим эпилепсией.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данное лекарственное средство необходимо применять с осторожностью во время беременности и кормления грудью. Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, решает врач индивидуально. Данные по фертильности отсутствуют.

Способ применения и дозы

Разовая доза:

дети от 2 до 6 лет - по 5 капель 3 раза в сутки;

дети от 6 до 12 лет по 7 капель 3 раза в сутки;

взрослые и дети старше 12 лет по 10 капель 3 раза в день до еды или через 1 час после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.

В острых случаях:

дети от 2 до 6 лет - по 5 капель каждые полчаса, но не более 8 раз в сутки;

дети от 6 до 12 лет - по 7 капель каждые полчаса, но не более 8 раз в сутки;

Доросли и дети старше 12 лет - по 10 капель каждые полчаса, но не более 8 раз в сутки.

Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.

Если симптомы сохраняются более 7 дней или наблюдается ухудшение состояния необходимо прекратить лечение и обратиться за консультацией к врачу.

Длительность применения лекарственного средства зависит от степени тяжести течения заболевания определяется врачом индивидуально.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям от 2 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

У лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможны такие аллергические реакции, крапивница, зуд.

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Специальных условий хранения не требует.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Картонная коробка содержит стеклянный флакон-капельницу по 30 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).