

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат: Belladonna 1000CH 20 мг, Hepar sulfur 1000CH 20 мг, Phytolacca 200CH 20 мг, Mercurius solubilis 1000CH 20 мг, Lachesis 1000CH 20 мг;

вспомогательные вещества: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Облегчает боль в горле, воспалительные явления, отечность. Способствует уменьшению гипертрофии миндалин и снижает количество рецидивов при хронических тонзиллитах.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

В комплексном лечении: острые тонзиллиты, рецидивирующие ангины.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно сочетание с любыми методами и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахараз-изомальтазы не следует применять этот препарат.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества - сахара кондитерского - проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не исследовалось. Вопрос о целесообразности применения лекарственного средства беременным и кормящим грудью, врач решает индивидуально.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 7 лет - по 7 гранул под язык до полного рассасывания; *детям в возрасте от 1 до 7 лет* - из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), гранулы растворяют в небольшом количестве воды в случае невозможности применения под язык. Лекарственное средство следует принимать за 15-20 минут до или через 1 час после еды.

Принимать в острый период (при боли в горле, повышении температуры) 3-5 раз в день до полного выздоровления.

При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часа. Далее перейти на прием 3-5 раз в сутки.

После выздоровления рекомендуется продолжить прием лекарственного средства 2 раза в сутки в течение 7 дней с целью профилактики осложнений.

При хронических тонзиллитах принимать 1-2 раза в сутки в течение 3-4 месяцев.

Для профилактики принимать 1-2 раза в сутки в течение 3-4 месяцев в холодное время года.

Дети

Не назначают детям в возрасте до 1 года.

Применение лекарственного средства детям в возрасте от 1 до 3 лет возможно только по назначению врача.

Передозировка

В большинстве случаев не приводит к негативным последствиям и не требует антидотовой терапии, но у лиц с гиперчувствительностью к компонентам препарата возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Упаковка

По 10 г в пенале или флаконе с крышкой; по 1 пеналу или флакону с крышкой в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).