

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит антитела к эндотелиальной NO синтазы аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений C12, C30 и C200 - 3 мг;

вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с насечкой и фаской, от белого до почти белого цвета. На одной плоской стороне нанесено черту, на другой плоской стороне нанесена надпись IMPAZA.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Повышает активность эндотелиальной NO синтазы, восстанавливает выработку эндотелием оксида азота (NO) при сексуальной стимуляции, повышает содержание в гладких мышцах циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) и способствует их расслаблению, что приводит к повышению кровенаполнения пещеристых тел, и обеспечивает достаточную по силе и продолжительностью эрекцию.

Препарат повышает либидо (половое влечение) и удовлетворения половым актом.

Регулярный прием препарата способствует повышению содержания тестостерона в сыворотке крови (при умеренно сниженном исходном уровне).

Показания

Нарушение эрекции (эректильная дисфункция) различного происхождения.

Вегетативные расстройства климактерического периода у мужчин (слабость, утомляемость, снижение физической активности, снижение либидо).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами не зарегистрированы. Возможно применение препарата на фоне приема органических нитратов больным с ишемической болезнью сердца (стенокардией напряжения I-II функционального класса), и применение совместно с бета-адреноблокаторами, диуретиками, ингибиторами АПФ (АПФ), антагонистами кальция.

Особенности применения

В состав препарата входит лактоза, поэтому пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы и врожденной лактазной недостаточностью нельзя применять препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не оказывает седативного действия, поэтому не влияет на скорость реакции.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применять взрослым мужчинам.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь. Не использовать вместе с пищей. Применять по 1 таблетке на прием. Таблетку держать во рту (желательно не разжевывая и не глотать) до полного растворения.

Варианты применения

1. Регулярный прием. Для стабилизации половой потенции (способности к половому акту) рекомендован лечебно-профилактический курс длительностью не менее 12 недель. В зависимости от выраженности эректильной дисфункции частота приема может варьировать от 1 таблетки через день до двух приемов по 1 таблетке ежедневно, желательно в

вечернее время.

В случае необходимости курсовую терапию можно повторить через 3-6 месяцев.

2. Периодический прием. Для эпизодического стимулирования эрекции препарат принимать перед половым актом по 2 таблетки за 1-2 часа до ожидаемой близости.

Дети

Препарат не применять детям.

Передозировка

При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные компонентами, входящими в состав препарата.

Побочные реакции

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 1 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Сантоника.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Ул. Вейвер 134Б, г. Каунас, Каунасское м. Один., LT-46353, Литва.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).