

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит хлорофиллипта экстракта густого (10,76: 1) (экстрагент этанол 93%) 25 мг;

вспомогательные вещества: сахар, аскорбиновая кислота, кальция стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки от светло-зеленого до зеленого цвета с вкраплениями, плоскоцилиндрические, с риской и фаской, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

Фармакодинамика

Хлорофиллипт является смесью хлорофиллов из листьев эвкалипта. Препарат оказывает антибактериальное (бактериостатическое и бактерицидное) действие в отношении стафилококков, а также антисептическое и противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Не исследована.

Показания

Заболевания верхних дыхательных путей (тонзиллиты, фарингиты, ларингиты), а также афтозные и язвенные стоматиты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хлорофиллипту или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Усиливает действие антисептических препаратов.

Особенности применения

Перед началом применения необходимо посоветоваться с врачом.

После первого применения следует сделать паузу на 6-8 часов. Курсовое лечение препаратом возможно после подтверждения отсутствия аллергической реакции на экстракт хлорофиллипта густого (вероятность отека губ, слизистой оболочки носа, зева и других аллергических реакций). Если появились какие-либо из приведенных симптомов, прием препарата необходимо прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не исследована.

Применение в период беременности или кормления грудью

Эффективность и безопасность применения препарата в период беременности и кормления грудью не изучали, поэтому не следует применять этой категории пациентов.

Способ применения и дозы

Взрослым назначать таблетки по 12,5 мг или 25 мг в зависимости от степени тяжести патологического процесса. Таблетки не глотать и не разжевывать, а держать во рту до полного рассасывания. Суточная доза - 25 мг 5 раз в сутки. Кратность приема - 1 таблетка (12,5 мг или 25 мг) каждые 4-5 часов. Курс лечения - 7 дней.

Дети

Нет опыта применения препарата у детей.

Передозировка

Возможно усиление побочных реакций.

Побочные реакции

Аллергические реакции, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек, гиперемия.

Со стороны пищеварительного тракта: раздражение слизистой оболочки ротовой полости, тошнота, рвота.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ° С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 таблеток в контейнерах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод» ГНЦЛС ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61057, Харьковская обл., Город Харьков, улица Воробьева, дом 8.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).